

FLORAÇÃO DA PRIMAVERA

Proseguindo na publicação da lista phenologica sazonal, damos, a seguir, a relação das plantas que florescem durante a primavera.

Doravante, além dos nomes scientificos, incluiremos os das respectivas familias botanicas.

Agapanthus umbellatus L. Herit. — Liliacea — Nome vulgar "agapantho". Herbacea. Flores de coloração azul intensa. Muito ornamental. Originario do Sul da Africa.

Albizzia lebbek Benth. — Leguminosa (Mimos.) — Nomes vulgares: "pau-negro", "ebano oriental", "guajessara", "coração negro". Arvore. Oriunda das regiões tropicaes.

Allamanda blanchetti A. DC. — Apocynacea — Arbusto escandente. Flores roxas. Ornamental — Brasileira.

Allamanda nobilis T. Moore. — Apocynacea. Trepadeira. Grandes flores amarellas, aromaticas. Ornamental. Brasileira.

Allamanda Schottii Pohl — Apocynacea. Trepadeira. Flores amarellas. Ornamental. Brasileira.

Allium Schœnoprasum L. — Liliacea. Flores vermelhas. Regiões temperadas.

Alpinia galanga Willd — Zingiberacea. Herbacea. Flor lilás. Asiatica.

Alpinia speciosa (Wendl) K. Schum. — Zingiberacea. Flor de coloração branca com petalas alaranjadas. Originaria das Indias.

Ardisia solanacea Roxb. — Myrsinacea. Arbusto. Flores roseas. Ornamental pelo aspecto e abundancia da fructificação. Originaria da I. Oriental.

Averrhoa carambola — L. — Oxalidacea. Nome vulgar: "carambola". Arvore. Flores pequeninas roxeadas. Fructos comestiveis. Originaria da China e Indias Orientaes.

- Bauhinia racemosa* Lam. — Leguminosa (Caesalp.) Arvore. Flores azues.
- Calliandra brevipes* Benth. — Leguminosa (Mimos.). Arbusto. Floração intensa, rosa, rosea e branca, de bello effeito. Ornamental tambem devido á belleza da folhagem. A planta floresce muitas vezes por anno e é propria do nosso paiz.
- Cassia drepanophylla* Benth. — Leguminosa (Caesalp.) Flores amarello-ouro. Brasil.
- Cassia fastuosa* Willd — Leguminosa (Caesalp.). Nome vulgar: “baratinha”. Arvore. Floração em lindos cachos amarellos. Odorante. Brasil.
- Cassia ferruginea* Schrad — Leguminosa (Caesalp.). Nomes vulgares: “Cana prista”, “cana-fistula”. Arvore. Flores amarello-ouro, em cachos pendentes. Odorante. Brasileira.
- Cassia grandis* Lin. f. — Leguminosa (Caesalp.). Nome vulgar: “Canafistula”. Arvore. Flores roseo arroxeadas, abundantes. Brasileira.
- Cassia leptophylla* Vog. — Leguminosa (Caesalp.). Arvore. Floração rosea, abundante. Muito ornamental. Brasileira.
- Clausena excavata* Brum. — Rutacea. Flores pequeninas, amarello-claro. Indias orientaes, Malaya.
- Clerodendron fallax* Lindl. — Verbenacea. Nome vulgar: “flor de coral”. Arbusto. Floração encarnada, bonita. Originaria de Java.
- Clerodendron tomentosum* R. Br. — Verbenacea. Trepadeira. Flores vermelhas, de sepalas cor de creme. Originaria da Australia. Floresce duas vezes por anno.
- Clusia grandiflora* Splitz — Guttifera. Nome vulgar: “cebola grande da matta”. Arvore. Flores lindas, grandes, roseas, com aspecto de porcellana. Brasileira.
- Combretum coccineum* Lam. — Combretacea. Trepadeira. Flores vermelhas. Madagascar.
- Couropita guianensis* Aubl. — Lecythidacea. Nomes vulgares: “abricó de macaco”, “castanha de macaco”. Arvore frondosa. Floração intensa em ramos eriçados pelo tronco. Flores grandes, bonitas, carnosas, roseas. Brasil e Guayanas.
- Crotalaria vitellina* Ker. Gaul. — Leguminosa (Papil.). Nome vulgar: “Manduruvá pequena”. Flores amarellas. Brasil.

- Cyrtopodium punctatum* Lindl. — Orchidacea. Nomes vulgares: "Sumaré", "Rabo de tatú", "bisturi do matto". Herbacea. Grandes cachos com flores pequenas, amarello-marrom, muito bonitos. Ornamental. Brasil.
- Dioclea macrantha* Hub. — Leguminosa (Papil.). Trepadeira. Flores roxas. Brasil.
- Entada scandens* Benth. — Leguminosa (Mimos.). Trepadeira. Floração em cachos amarelos. Brasil.
- Episcia cupreata* Haust. — Gesneriaceae. Herbacea. Ornamental por sua folhagem matisada cor de cobre. Originaria de Nicaragua.
- Erythrina indica* Lam. — Leguminosa (Papil.). Arvore. Flores vermelhas. Asia tropical.
- Esenbeckia leocarpa* Eugl. — Rutacea. Nome vulgar: "guaratan". Arvore. Floração branca. Brasil e Chile.
- Eugenia brasiliensis* Lam. — Myrtacea. Nome vulgar: "grumixama". Arvore. Flores pequenas, branco-amarelladas. Fructos comestiveis. Brasil.
- Gladiolus communis* L. — Iridacea. Herbacea. Flores roseas, em pendões. Ornamental. Europa.
- Helicteres sacarrolha* A. Juss. — Sterculiaceae. Nome vulgar: "sacarolha". Curiosa pelo fructo de formato helicoidal. Brasil.
- Hœmanthus coccineus* Lin. — Amaryllidacea. Nome vulgar: "Couroa de Moçambique". Herbacea. Flores vermelhas cujas hastes surgem do solo após desaparecimento das folhas. Ornamental. Africa austral.
- Hemerocallis aurantiaca* Bak var. *major* Bak — Liliacea. Herbacea. Floração em pendões. Flores grandes amarellas, bonitas. Originaria do Japão.
- Hemerocallis fulva* L. — Liliacea. Herbacea. Flores cor de abóbora, grandes, bonitas. Originaria da Asia.
- Hoya carnosa* R. Br. — Asclepiadacea. Nome vulgar: "flor de cera". Trepadeira. Flores pequenas da cor e consistencia da cêra. Asia tropical e Australia.
- Impatiens balsamina* L. — Balsaminacea. Nome vulgar: "beijo de frade". Herbacea. Cores variadas. India.
- Inga cordistipula* Mart. — Leguminosa (Mimos.). Floração branca. Brasil.
- Ixora alba* L. — Rubiaceae. Arbusto. Flores alvas bonitas, ornamentaes. Originaria das Indias Orientaes.
- Ixora odorata* Hook — Rubiaceae. Semelhante á anterior porem de flores maiores, rosadas e aromaticas. Africa.

- Jacaranda semiserrata* Cham. — Bignoniacea. Nomes vulgares: "Caroba do matto", "Carobo". Flores roxas. Brasil.
- Jasminum sambac* Soland. — Oleacea. Branca. Asia tropical.
- Jatropha podagrica* Hook. — Euphorbiacea. Nome vulgar: "batata do inferno". Pequeno arbusto. Flores pequenas, vermelho claro, abundantes. Ornamental. Floresce varias vezes por anno. Panamá.
- Kaempferia galanga* L. — Zingiberacea. Nome vulgar: "Cananga do Japão". Herbacea. Flores grandes, delicadas, roseo arroxeadas, surgindo do solo após desaparecimento completo das folhas. Ornamental. Asiatica.
- Kigelia aethiopica* Decne — Bignoniacea. Arvore. Floração em grandes cachos pendentes. Flores grandes de cor vermelho carne, bonitas. Africa.
- Lagerstroemia flos-reginæ* Retz — Lythracea. Arvore. Floração em grandes cachos, erectos, abundantes, roseo-violaceos. Muito bonita. Asia tropical.
- Lecythis pisonis* Cambess. — Lecythidacea. Nome vulgar: "Sapucaia". Arvore. Floração intensa, branco-roseo. Fructos grandes, lenhosos. Brasil.
- Lilium longiflorum* Thunb. — Liliacea. Nome vulgar: "palma de S. José". Branca. China e Japão.
- Lippia lycioides* Steud. — Verbenacea. Nome vulgar: "cedron". Arbusto. Floração em cachos brancos muito aromaticos. Brasil.
- Lundia nitidula* A. D. D. — Bignoniacea. Branca ligeiramente rosada. Brasil.
- Malpighia coccigera* L. — Malpighiaceae. Arbusto. Flores pequeninas, brancas (ligeiramente roseas) abundantes. Ornamental. Originaria das Indias occidentaes.
- Mauritia flexuosa* L. f. — Palmacea. Nomes vulgares: "Merity", "arvore da vida". Grande palmeira, folhas largas, elegantes. Floração em enormes cachos amarelos. Brasil.
- Metternichia principis* Mik. — Solanacea. Arbusto. Floração branca. Brasil.
- Nelumbo nucifera* Gaertn. — Nymphaeacea. Nome vulgar: lotus. Herbacea, aquatica. Flores grandes, brancas e roseas. Originaria do Egypto.
- Nolina recurvata* Memsl. — Liliacea — Branca. Mexico.
- Pavonia spinifix* Cav. — Malvacea. Nome vulgar: "arranca estrepe". Amarella. Brasil.
- Peireskia grandifolia* Haw. — Cactacea. Arbusto. Flores roseas, bonitas. Ornamental. Colombia.

- Petraea volubilis* Jacq. — Verbenacea. Nome vulgar: “flor de viuva”. Trepadeira. Floração em cachos azul violaceos. Floresce varias vezes por anno. Brasileira.
- Plathymenia foliolosa* Benth. — Leguminosa (Mimos.). Nome vulgar: “Vinhatico do campo”. Arvore frondosa. Flores pequenas, pardas. Brasil.
- Plumiera tricolor* Ruiz e Pav. — Apocynacea. Flores amarello-claro-laranja e vermelho. Originaria da America tropical.
- Poinciana regia* Boj. — Leguminosa (Caesalp.) Nome vulgar: “flamboyant”. Arvore. Bella floração vermelha. Originaria de Madagascar.
- Psychotria alba* Ruiz et Pav. — Rubiaceae. Arbusto. Flores alvas. Brasil.
- Quassia amara* L. — Simarubacea. Nome vulgar: “quassia”. Flores vermelhas. Guyanas.
- Quisqualis indica* L. — Combretacea. — Trepadeira. Flores vermelhas, aromaticas. Originaria da Asia tropical.
- Sinningia speciosa* (Lodd) Benth e Hook — Gesneriaceae — Nome vulgar: “gloxinia”. Herbacea. Flores roxas, bonitas. Brasil.
- Spathiphyllum cannifolium* Schott. — Aracea. Herbacea. Flores pequenas e spatha alva. Brasil.
- Spiraea chamædrifolia* L. — Rosacea. Nomes vulgares: “Bouquet de noiva”, “flor de noiva”. Arbusto. Flores alvas. Europa oriental e Asia boreal.
- Stromanthe sanguinea* Sond. — Marantacea. Vermelha. Brasil.
- Tibouchina holosericea* Bail — Melastomatacea. Nome vulgar: “orelha de urso”. Flores roxas. Brasil.
- Tibouchina maximiliana* Bail — Melastomatacea. Flores roxas. Brasil.
- Tibouchina mutabilis* Cogn. — Melastomatacea. Arvore. Flores grandes, roxas, que passam depois a branco-violaceo. Brasil.
- Tibouchina pulchra* Cogn. — Melastomatacea. Brasil.

L. A. P.